Tome 68, nº 30 — Septembre 1961

Rectification de la clé de détermination des espèces du sous-genre *Lecithodendrium* Looss 1896 (Trematodes)

par

Georges DUBOIS

Deux erreurs se sont glissées dans l'établissement de la clé que nous avons proposée (1960, Rev. suisse Zool. 67 (1): 60-61): l'une était l'omission du chiffre 7, l'autre concerne *Lecithodendrium (L.) granulosum* Looss 1907. Cette espèce a été retrouvée en Egypte et identifiée par le Dr R. W. Macy, qui a eu l'amabilité de nous en remettre quelques exemplaires, ce dont nous le remercions vivement. Ces exemplaires possèdent un œsophage bien développé, d'une longueur de 100 μ (d'après les figures 4 *a* et *b* de Looss, cet organe mesurait environ 60 μ), ce qui nécessite une modification dès le chiffre 3 de la clé de détermination. Rectifiée, celle-ci se présente comme suit (nº 1 et 2 sans changements):

3. Œsophage présent (60-220 μ) 4
— Œsophage absent 6
4. Follicules vitellogènes groupés en rosette dans le champ testiculaire. Œufs 15-23/8-15 μ 5
— Follicules vitellogènes groupés en grappe marginale (les deux grappes étant séparées par toute la largeur du champ utérin). Œufs 24-28/11-15 μ. Tchécoslovaquie.
L. (L.) rysavyi Dubois 1960
5. Glandes vitellogènes composées de 7 follicules à gauche, de 9 à droite. Inde, Europe et Etats-Unis.
L. (L.) mödlingeri (Pande 1935)

— Glandes vitellogènes composées chacune d'une douzaine de follicules. Egypte et ? Europe.
L. (L.) granulosum Looss 1907

6. Corps piriforme, à constriction transversale prétesticulaire (c'est-à-dire au premier tiers de sa longueur). Parasite de Rongeurs *(Dryomys)* [1]. Russie.
L. (L.) semen (Kirschenblatt 1941)

— Corps arrondi ou ovale 7

7. Ventouses subégales. Russie.
L. (L.) rotundum Shtrom 1935

— Ventouse buccale > acetabulum (80/100 μ et 65 μ respectivement). Cuba . . *L. (L.) pricei* Pérez Vigueras 1940

---

[1] Hôte accidentel ?